

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!

Важно понимать, что анестезия – не просто сон и защита от боли. В задачу анестезиолога входит контроль и управление всеми жизненно важными функциями пока пациент находится в медикаментозном сне: дыханием, кровообращением, деятельностью головного мозга, обменом веществ – в условиях чрезвычайной для организма ситуации, связанной с данной манипуляцией. Поэтому вопросы, которые будет задавать анестезиолог, назначенные обследования и рекомендации необходимы для безопасного проведения анестезии, безопасности здоровья и жизни пациента как во время анестезии, так и в послеоперационном периоде.

Обследование перед наркозом:

- 1) Общий анализ крови.
- 2) Коагулограмма (АЧТВ, ТВ, МНО, фибриноген).
- 3) Биохимический анализ крови (общий белок, глюкоза, мочевины, креатинин, билирубин).
- 4) Общий анализ мочи.
Анализ действителен в течение 14 дней.
- 5) Группа крови, резус фактор.
- 6) ЭКГ - действительна в течение месяца.
- 7) Консультация врача-терапевта (при необходимости может назначаться консультация смежных специалистов). Действительна в течение 14 дней.
- 8) Если анализы пересылали в электронном виде, то в день прохождения процедуры важно иметь результаты анализов на бумажном носителе (оригинал или копия) для внесения данных в медицинскую документацию)

Для предотвращения осложнений во время анестезии вам нужно соблюдать следующие условия:

1. Не принимать пищу минимум в течение 6 часов до анестезии;
2. Не пить любые напитки, включая воду, минимум за 4 часа до анестезии;
3. Минимум в течение суток до проведения анестезии не принимать алкоголь и не курить.
4. Перед наркозом извлеките из ротовой полости все съемные предметы, если таковые имеются (зубные протезы, пирсинг). Все эти предметы после введения в наркоз могут вызвать проблемы с Вашим дыханием.
5. Подготавливаясь к наркозу также снимите контактные линзы, слуховой аппарат.

После анестезии в течение 12 часов вам нельзя:

1. Выполнять работы, связанные с необходимостью повышенной концентрации и внимания;

2. Управлять транспортным средством;
3. Принимать какие-либо важные решения или подписывать юридические документы
4. Принимать алкоголь.

Общая анестезия может повлиять на Вашу способность правильно и быстро реагировать на происходящие события, что может повлечь за собой серьезные последствия, как для здоровья и жизни, так и юридического характера.

Виды активности, связанные с повышенной концентрацией и вниманием, требуют полного восстановления психомоторных функций, что иногда занимает 24-72 часа после операции и наркоза.

Обязательно сообщите анестезиологу, если:

1. Вы страдаете сахарным диабетом, аллергией;
2. У вас повышенное давление;
3. Вы страдаете ишемической болезнью сердца или переносили инфаркт миокарда;
4. У Вас есть хронические заболевания органов дыхания (например, бронхиальная астма);
5. В ближайшее время (две недели) переносили ОРВИ или грипп;
6. Вы постоянно принимаете любые лекарственные препараты (желательно заранее подготовить список этих препаратов);
7. Вам уже делали анестезию, и после нее возникли осложнения.

Если Вы нарушили какое-либо из этих условий, анестезиолог вправе отказать в проведении анестезиологического пособия.

К причинам, исключающим возможность проведения плановой анестезии, можно отнести:

1. Нестабильность соматического состояния (декомпенсация хронических заболеваний);
2. Острые воспалительные или инфекционные заболевания, не связанные с предстоящим вмешательством;
3. Отсутствие голодной паузы;
4. Патологическое ожирение
5. Отсутствие или несоответствие сроков лабораторных исследований.
6. Наличие алкогольной или наркотической зависимости

После наркоза вам обязательно нужно будет соблюдать рекомендации анестезиолога. Желательно, чтобы кто-то из родственников сопровождал пациента из клиники домой. Также нужно иметь в виду, что в случае непредвиденных реакций на обезболивание, которые случаются крайне редко, некоторым пациентам может потребоваться госпитализация для наблюдения в послеоперационном периоде.